木质素对土壤 N、P 转化及玉米产量的影响*

黄益宗 冯宗炜 张福珠

(中国科学院生态环境研究中心 北京 100085)

摘要 研究造纸黑液中提取的木质素对土壤 N、P 转化及其对玉米生长和产量的影响结果表明,木质素可减缓 NH_4^+ 向 NO_3^- 氧化,且随其施用量的增加效果更显著。木质素与磷酸二铵混合施用效果最佳,其次为硫酸铵 > 尿素。在 30℃ 温度下培养 27d,施用量为 2% 和 5% 的木质素可分别减少施尿素土壤 N_2O 释放 83% 和 96%;而施磷酸二铵的土壤则分别减少 83% 和 93%。施用木质素可促进难溶性 P 的溶解,对作物生长极为有利。玉米盆栽试验中施用木质素的根系较发达、粗壮,平均株高、地上部和地下部的鲜物质量和干物质量均高于不施木质素的处理。木质素用量为 50 $\mu\text{g/g}$ 和 200 $\mu\text{g/g}$ 时玉米籽粒产量分别提高 4.2% 和 18.8%。

关键词 木质素 N、P 转化 N_2O 释放 玉米产量

Effect of lignin on N, P transformation in soil and corn yield. HUANG Yi-Zong, FENG Zong-Wei, ZHANG Fu-Zhu (Research Center of Eco-Environment Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085), *C/EA*, 2001, 9 (3): 75~77

Abstract Effect of lignin isolated from black liquor of pulping process on N, P transformation in soil and corn yield has been determined. Results show that lignin can inhibit oxidization of NH_4^+ to NO_3^- , and the inhibiting effects increase with concentration. Both $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ and $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ treatments are more effective for inhibiting nitrification than urea treatment when lignin is applied. Urea plus 2% and 5% lignin can reduce N_2O emissions by about 83% and 96%, respectively, while $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ plus 2% and 5% lignin can respectively reduce N_2O emissions by 83% and 93% (30℃). Water-solubility P content in soil increases when lignin is applied. The results of potted test show that corn growth is better at lignin treatment than at non-lignin treatment. Lignin accelerates corn root and height growth. At concentrations of 50 $\mu\text{g/g}$ and 200 $\mu\text{g/g}$, lignin increases corn yield 4.2% and 18.8%, respectively.

Key words Lignin, N P transform, N_2O emission, Corn yield

能源和化学原材料的短缺使人们日益关注资源的再利用问题,我国每年有大量富含木质素的造纸黑液被排放到水体中,导致大量资源浪费和环境污染。许多研究已报道,从造纸黑液中提取的木质素可作为燃料、聚合粘合剂、抗氧化剂、加固剂和肥料缓释剂等再利用,本试验侧重研究从造纸黑液中提取的木质素对土壤 N、P 转化及其对玉米生长与产量的影响。

1 试验材料与方法

供试土壤采自北京市北郊农场史各庄科技园耕地 0~20cm 表土,壤质为偏碱性潮褐土,土壤 pH 值为 8.58,全 N 1.0g/kg,全 P 1.6g/kg,有机质 13.4g/kg, C/N 值为 7.8。供试木质素由中国科学院生态环境研究中心资源再利用实验室提供,为造纸黑液酸性提取法产品。木质素对土壤 N 的影响试验,称取 20g 土壤置于 250mL 玻璃瓶内,加入 4mg 纯 N 尿素(a)、硫酸铵(b)和磷酸二铵(c);木质素施用量(在每 g 土壤中,下同)设 0 $\mu\text{g/g}$ (CK)、10 $\mu\text{g/g}$ (I)、50 $\mu\text{g/g}$ (II) 和 200 $\mu\text{g/g}$ (III) 4 个水平,土壤水分调节至田间持水量的 70%,在 20℃ 温度下进行通气培养,每处理 3 次重复,培养 7d 和 14d 后把培养箱中培养瓶取出分析瓶中土壤的 NH_4^+-N 和 NO_3^--N 含量。木质素对土壤 N_2O 释放的影响试验,称取 20g 土置于 50mL 试管中,加入 2mg 纯 N 的尿素或磷酸二铵,木质素的施用量设 0mg/g、20mg/g 和 50mg/g 3 个水平,土壤水分调节至田间持水量的 70%,用橡胶塞塞紧试管口以防漏气,每处理 3 次重复,在 30℃ 温度下培养 27d。分别在培养 3d、6d、9d、12d、15d、18d、21d、24d 和 27d 后从培养箱中取出试管,用 30mL 玻璃注射器采集气体样品,样品中的 N_2O 用

* 国家自然科学基金项目(39790109)资助

收稿日期:2000-06-12 改回日期:2000-07-16

配有美国 Varian 公司生产的电子捕获检测器的 SP-3410 气相色谱仪(北京分析仪器厂)进行测定。用渗漏计试验研究木质素对土壤 P 转化的影响,渗漏计土柱高 20cm,直径 8cm,装 1.4kg 土壤,土柱底部铺有 2.5cm 细沙,试验肥料为磷酸二铵,施用量以每 kg 土壤 0.3gP₂O₅ 计算。木质素设(在每 g 土壤中)0μg/g、100μg/g、500μg/g 和 1000μg/g 4 个水平,3 次重复,控制渗漏速度在 100ml/h 左右,每 10h 收集渗漏液,分析其水溶性 P 含量和 pH 值。木质素对玉米产量的影响,试验用盆栽 28.5cm × 28.5cm,装土 15kg,供试玉米品种为“96-1”(由中国农业科学院提供),土壤施肥磷酸二铵 0.15g/kg。N 的计算试验为木质素(在每 g 土壤中)设 0μg/g、50μg/g 和 200μg/g 3 个水平,3 次重复。1999 年 6 月 25 日种植玉米和施肥(种植前玉米种子经过催芽培养),每盆定植 4 株;1999 年 8 月 19 日测定玉米株高、地上部鲜物质质量和干物质质量、地下部鲜物质质量和干物质质量;1999 年 9 月 29 日收获玉米并测定产量。

2 结果与讨论

2.1 木质素对土壤 N 转化的影响

N 肥施入土壤后,经过硝化反应把 NH₄⁺ 氧化为 NO₃⁻。NO₃⁻ 和 NH₄⁺ 虽是作物可利用的有效性氮,但 NO₃⁻ 比 NH₄⁺ 在土壤中易于移动和被淋溶损失掉,造成肥料浪费和污染水体,硝化反应过程也可产生 N₂O。

木质素能减缓 NH₄⁺ 向 NO₃⁻ 氧化,其效果因施 N 土壤不同而异(见图 1)。施用尿素、硫酸铵和磷酸二铵的土壤经过 I、I 和 III 处理施用木质素并培养 7d, NH₄⁺-N 含量分别比对照提高 16.0%~27.8%、20.4%~46.1% 和 28.8%~62.4%, NO₃⁻-N 含量分别降低了 9.4%~16.8%、10.4%~23.1% 和 11.6%~26.5%; 培养 14d, NH₄⁺-N 含量分别比对照提高了 30.1%~88.9%、49.5%~97.1% 和 50.9%~107.0%,

图 1 木质素对不同施肥处理土壤 NH₄⁺-N 和 NO₃⁻-N 含量的影响

Fig.1 Effect of lignin on NH₄⁺-N and NO₃⁻-N content in soil treated with different fertilizers

NO₃⁻-N 含量分别比对照降低了 5.1%~15.8%、9.4%~19.3% 和 10.4%~21.3%。

2.2 木质素对土壤 N₂O 释放的影响

由图 2 可知木质素对施尿素土壤 N₂O 释放的影响,不施木质素的对照处理 N₂O 释放至第 6d 时达最大值,为 52.6mg/m³,第 6d 后 N₂O 释放迅速下降,至第 15d 时 N₂O 释放仅为 1.2mg/m³。施用 20mg/g 的木质

图 2 木质素对施尿素土壤 N₂O 释放的影响

Fig.2 Effect of lignin on N₂O emission from soil treated with urea

素后 N₂O 释放大大减少,培养第 15d 时仅有较小的 N₂O 释放高峰(4.6mg/m³)。施用 50mg/g 木质素后 N₂O 释放量更少,可忽略不计。经计算,培养 27d 施用 20mg/g 和 50mg/g 的木质素比对照 N₂O 释放分别减少 83% 和 96%。当 N 素肥料为磷酸二铵时对照 N₂O 释放从第 3d 的

图 3 木质素对施磷酸二铵土壤 N₂O 释放的影响

Fig.3 Effect of lignin on N₂O emission from soil treated with (NH₄)₂HPO₄

27.0mg/m³ 增至第 18d 的 99.7mg/m³,第 18d 后迅速下降,培养至

第 21d 时 N₂O 释放量很少。施用 20mg/g 的木质素后 N₂O 释放明显减少,其 N₂O 释放高峰期(第 18d)比对照减少 71%。而施用 50mg/g 的木质素后 N₂O 释放极少。在 27d 培养过程中经过 20mg/g 和 50mg/g 的木质素处理后,N₂O 释放分别比无木质素处理的对照减少 83%和 93%(见图 3)。

2.3 木质素对土壤 P 转化的影响

土壤施 P 后,P 易在土壤中积累。据报道,P 肥当季利用率仅有 10%~25%,每年施入的 P 约有 75%~90% 积累在土壤中。P 在土壤中易与 Ca、Al、Fe 和 O 等形成无机磷复合体。成瑞喜等认为,在中、酸性土壤中 Ca₂-P、Al-P 和 Fe-P 是土壤有效磷的重要来源,O-P 和 Ca₁₀-P 在土壤中较稳定,对作物基本无效^[1]。在施用磷酸二铵的土壤中经过木质素处理后,土壤中水溶性 P 的释放提前,不施木质素的处理至 30h 后才有水溶性 P 释放出来,而施木质素后第 10h 即可检出水溶性 P 存在(见图 4)。木质素施用量越高,水溶性 P 的释放量越大,且迅速达到最大值。施用木质素后土壤渗透水的 pH 值变化不大,故木质素促进水溶性 P 的释放不是因 pH 值的变化所引起,而可能是由于木质素与土壤的 Ca、Al、Fe 等元素发生作用,使 P 与这些元素形成难溶性复合体的机会减少,或由于木质素为无机磷矿化菌和无机磷溶解菌提供丰富的碳源,这 2 种细菌大量繁殖促进了土壤难溶性 P 的溶解原因所致。

图 4 不同木质素施用量对土壤 P 转化的影响
Fig. 4 Effect of lignin on P transform in soil

2.4 木质素对玉米生长与产量的影响

木质素对玉米生长影响的盆栽试验结果见表 1,由表 1 可知木质素可促进玉米生长和提高籽粒产量,玉米种植 55d 后木质素施用量 50μg/g 和 200μg/g 时,平均株高分别比不施木质素的对照增加 5.7%~12.6%,地上部干物质量增加 14.6%~21.8%,地下部干物质量增加 36.6%~63.4%。施用木质素后玉米根

表 1 木质素对玉米生长及产量的影响

Tab. 1 Effect of lignin on corn growth and corn yield

施用量/μg · g ⁻¹ Amount of lignin applied	平均株高/cm Mean plant height	鲜物质量/g · 盆 ⁻¹ 地上部 Over ground	Fresh mass 地下部 Under ground	干物质量/g · 盆 ⁻¹ 地上部 Over ground	Dry mass 地下部 Under ground	产量/g · 盆 ⁻¹ Yield
0	133.7	646.0	61.2	100.5	9.3	300.4
50	141.3	714.4	80.8	115.2	12.7	313.1
200	150.6	742.8	97.2	122.4	15.2	356.8

* 平均株高、地上部和地下部鲜物质量、干物质量为玉米种植 55d 后测定结果;产量为玉米收成后测定结果。

系较发达、粗壮,有利于对土壤养分吸收,木质素处理比对照玉米籽粒产量提高 4.2%~18.8%。木质素提高作物产量的原因是它为 1 种天然的高分子化合物,具有复杂的网状结构分子和多种活性基团(羧基、酚羟基、羟基醌等),在木质素吸附和络合作用下大大提高土壤的 N、P 有效性,满足作物的生长需要。穆环珍等研究了木质素包衣尿素的一些物理和化学特性,发现该肥料比普通尿素水溶性降低,可抑制土壤脲酶活性,减缓尿素的水解,从而减少氨的挥发损失。木质素包衣尿素供 N 水平较普通尿素高 0.4~1.1 倍^[2],开发和利用从造纸废液提取的木质素,对环境保护和资源的再利用均具有十分重要的现实意义。

参 考 文 献

- 1 成瑞喜等. 磷肥对酸性土壤无机磷形态转化及其有效性的影响. 土壤, 1995, 27(5): 225~268
- 2 穆环珍等. 木质素氮肥增效剂研制与增产效应研究. 农业环境保护, 1999, 18(6): 251~253

欢迎订阅 2002 年《华北农学报》

《华北农学报》是由北京、天津、河北、山西、内蒙古、河南 6 省(区)市农科院和农学会联合主办的大农业学术刊物。主要刊登农业各学科的学术论文、研究报告、科研简报及学术动态,适于农业科研人员、技术人员、大专院校师生等阅读。本刊为季刊,每期定价 5.00 元,全年 20.00 元,邮发代号:18-10,全国各地邮局均可订阅。漏订者可汇款至本刊补订,地址:(050051)石家庄市和平西路 598 号《华北农学报》编辑部。

欢迎订阅 2002 年《中国果树》

《中国果树》是由中国农业科学院果树研究所主办的技术期刊,主要报道我国果树科研新成果、新技术、新经验,交流果树生产先进经验,普及果树科技知识,提供国外果树科技信息等。本刊为双月刊,每期定价 4.00 元,全年 24.00 元,邮发代号:8-106,全国各地邮局均可订阅。漏订者可汇款至本刊补订,地址:(125100)辽宁省兴城市中国农业科学院果树研究所《中国果树》编辑部。