水稻与冬小麦对臭氧的反应及其敏感性试验研究*

白月明 郭建平 王春乙 温 民

(中国气象科学研究院 北京 100081)

摘 要 利用 OTC-1 型开顶式气室对我国主要粮食作物水稻、小麦进行不同 O_3 浓度的长期接触试验结果表明, O_3 浓度增加可促进水稻发育, 小麦前期发育缓慢, 后期衰老加快。水稻和小麦灌浆期缩短, 株高下降; 随着通气时间的延长, 干物质量降低。小麦叶片含水率呈抛物线型下降, 但对水稻影响不大; 在同样高浓度 O_3 环境下水稻叶片受害较小麦晚、发展慢; O_3 浓度增加, 单株产量和千粒重下降, 且小麦减产幅度大于水稻。小麦对 O_3 的反应比水稻敏感。

关键词 水稻 冬小麦 臭氧 敏感性

The reaction and sensitivity experiment of O_3 on rice and winter wheat BAI Yue-Ming, GUO Jian-Ping, WANG Chun-Yi, WEN Min (Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081), *CJEA*, 2002, 10(1): 13~16

Abstract The long-term experiments of different O_3 concentrations on main food crops in China are conducted by using OTC-1 top-opened chambers. The results show that increasing O_3 concentration would promote rice development. The winter wheat development would be slow in early days, but fast in late time. The milk duration and plant height of rice and wheat would be shortened. The dry biomass would be decreased with the prolong of ventilation time. The water content in leaf of winter wheat would be decreased as parabola type, but there is small impact on rice. Under the same higher O_3 concentration environment, the beginning date of rice leaf injured by ozone was later than winter wheat, and the injury development slow. With the O_3 concentration increasing, the yield of per plant and thousand grains weight would be decreased, and the loss scale of winter wheat yield by ozone is greater than that of rice. The reaction of winter wheat to O_3 concentration is more sensitive than that of rice.

Key words Rice, Winter wheat, Ozone, Sensitivity

水稻和小麦是我国主要粮食作物, 种植面积占粮食作物总面积的 56%, 产量占粮食总产量的 66% (1989 年), O_3 浓度增加对水稻和小麦作物影响较大^[1~3]。因此, 研究水稻和小麦对 O_3 的反应有重要的意义。1999 年本研究利用 OTC-1 型农田开顶式气室对冬小麦和水稻进行了不同浓度 O_3 长期熏气试验, 利用其中部分资料分析了水稻和小麦对 O_3 反应的差异, 探讨二者对 O_3 反应的敏感性问题, 估算 O_3 造成的损失并提供水稻和小麦作物种植面积的参考比例。

1 试验设计与方法

试验采用盆栽法, 盆口直径 36cm, 高 26cm。供试冬小麦“京冬 6 号”于 1999 年 3 月 31 日移入气室, 4 月 3 日~6 月 3 日通气; 水稻“中作 97”同年 6 月 9 日移栽, 每盆 20 株(5 穴), 7 月 11 日~9 月 20 日通气, 通气时间为每天 9:00~16:00。

实验 O_3 浓度为 8.93nmol/L (处理 A 或 a)、4.46nmol/L (处理 B 或 b)、2.23 nmol/L (处理 C 或 c)、过滤处理(过滤掉背景环境中的 O_3 , 其 O_3 浓度约相当于 0.45nmol/L, 为处理 D 或 d) 和对照(1.12~1.78nmol/L, 处理 E 或 e) 5 个处理(为叙述方便, 以下用处理 A、处理 B、处理 C、处理 D、处理 E 表示冬小麦和用处理 a、处理 b、处理 c、处理 d、处理 e 表示水稻的 5 种浓度处理)。供试 O_3 用高纯度 O_2 经 QHG-1 型高频 O_3 发生器生成, 气室内浓度用 HORIBA-AMBIENT O_3 监测仪监测。试验观测项目主要有作物发育期、株高、各器官生物量干(鲜)物质量、叶片伤害状况以及叶片光合、蒸腾速率、气孔阻力、气温、叶温、 CO_2 浓度等生理生态参数。

* 国家自然科学基金重大资助项目(49899270)部分研究内容

收稿日期: 2000-08-31 改回日期: 2000-11-26

2 结果与分析

2.1 O₃ 浓度对作物发育进程的影响

不同 O₃ 浓度下水稻和冬小麦的发育期及株高见表 1, 由表 1 可知, 处理 a 和处理 b 在整个试验期内各发育期平均比处理 e 分别提前 2d 和 1d, 处理 c 在试验中期(抽穗~开花)比处理 e 提前 2~3d, 处理 d 和处理 e 差异不大。处理 A 在开花期以前比处理 E 推迟 1~3d 进入发育期, 乳熟期以后提前 5~7d; 处理 B 在抽穗前比处理 E 推迟约 1d, 开花后平均提前 2d。由此可知, O₃ 浓度达 4.46nmol/L 以上时对水稻发育有促进作用, 使发育期提前; 小麦则表现为前期发育缓慢, 后期衰老加快。水稻和小麦在 8.93nmol/L 和 4.46nmol/L O₃

表 1 不同 O₃ 浓度下水稻与冬小麦发育期及株高的变化

Tab 1 The variations of the development periods and height of rice and winter wheat in different O₃ concentrations

作物	处理	拔节/d	株高/cm	孕穗/d	株高/cm	抽穗/d	株高/cm	开花/d	株高/cm	乳熟/d	株高/cm	成熟/d	开花~ 成熟/d	拔节~ 成熟/d
Crop	Treatments	Jointing	Height	Booting	Height	Heading	Height	Blooming	Height	Milk maturity	Height	Maturity	Blooming- Maturity	Jointing- Maturity
水稻	a	-3	+2.2	+1	-4.1	0	-5.8	-2	-9.0	-4	-3.4	-3	47	67
	b	-2	+4.5	-1	-3.2	+1	+10.0	-1	-2.5	-2	-0.7	-3	46	66
	c	0	+3.6	0	-4.8	-2	-4.9	-3	+2.2	0	-0.2	0	51	67
	d	0	+1.4	+1	-3.9	+1	-4.4	0	+2.4	0	+2.3	0	48	67
	e	07-29	67.0	08-08	78.1	08-14	85.4	07-17	88.8	09-24	94.2	10-04	48	67
冬小麦	A	+1	-0.6	+1	-0.8	+3	-7.7	+1	-6.6	-7	-8.1	-5	30	47
	B	0	-0.4	+1	-0.7	+1	+3.8	-2	-4.3	-1	-4.9	-3	33	49
	C	0	+0.5	0	-0.4	+1	+0.8	-1	-1.5	0	-1.1	0	35	53
	D	-1	+1.1	0	+0.1	+1	+5.5	-1	-3.7	0	-0.9	0	35	53
	E	04-13	27.5	04-16	23.8	04-28	54.9	05-05	68.9	06-02	71.5	06-08	34	53

浓度下成熟期均比对照提前, 造成灌浆期缩短, 是导致产量下降的原因之一。O₃ 浓度增加可抑制水稻和小麦植株高度, 浓度越高, 通气时间越长则影响越大。处理 A、处理 B 分别在通气约 15d(拔节期)和 35d(抽穗期)下降, 开花期对 O₃ 反应最敏感, 株高分别下降 9.0cm 和 2.5cm, 2 处理株高均比处理 E 降低, 敏感期为乳熟期, 分别下降 8.1cm 和 4.9cm。

2.2 O₃ 浓度对作物根重的影响

处理 a 和处理 A 的根重始终低于对照, 且均在成熟期影响最显著, 分别比对照下降 41.5% 和 60.9%, 小麦比水稻反应更敏感(见表 2)。处理 b 除仅通气初期和乳熟期比处理 e 高外, 其余均比处理 e 低, 试验期间平均降低 68%, 处理 B 通气初的 20d 内高于处理 E, 随着通气时间延长而逐渐下降, 至成熟期降到最低, 下降 36.1%。

表 2 不同 O₃ 浓度下水稻、冬小麦根重比对照相对减少率

Tab 2 The decreasing rate of the root weight of rice and winter wheat in different O₃ concentrations (compared contrast)

取样日期 (月·日)	水稻 Rice					取样日期 (月·日)	冬小麦 Winter wheat				
	处理 a/%	处理 b/%	处理 c/%	处理 d/%	处理 e/%		处理 A/%	处理 B/%	处理 C/%	处理 D/%	处理 E/%
Date of sample (month-day)	Treatment a	Treatment b	Treatment c	Treatment d	Treatment e	Date of sample (month-day)	Treatment A	Treatment B	Treatment C	Treatment D	Treatment E
07-21	-0.4	11.3	25.6	0.7	1.046	04-11	-3.3	19.9	18.5	-15.3	0.953
08-01	-11.5	-0.5	15.4	29.3	1.373	04-21	-5.8	2.5	14.9	3.4	1.318
08-11	-21.3	-5.8	2.1	0.1	2.139	05-01	-10.4	-7.2	3.1	5.1	1.695
08-21	-30.3	-14.0	-0.3	20.5	2.479	05-11	-31.2	-30.3	-24.4	-16.4	2.318
09-01	-24.1	-22.0	0.6	18.1	2.199	05-21	-34.0	-27.4	-12.1	9.2	2.140
09-11	-22.5	-11.4	-6.5	7.8	2.619	06-01	-60.9	-31.6	-1.6	20.3	2.138
09-21	-30.5	-4.5	-6.3	5.1	2.361	06-05	-57.2	-36.1	59.0	22.6	1.819
10-01	-41.5	-16.1	14.3	12.6	1.975	平均	-29.0	-15.7	8.2	4.1	-
平均	-23.2	-6.8	5.6	11.8	-						

2.3 O₃ 浓度对作物地上生物量的影响

水稻和小麦在不同 O₃ 浓度下地上部分干物质质量变化曲线见图 1。由图 1(a)可知,当水稻受 8.93 nmol/L 和 4.46 nmol/L O₃ 浓度影响时,整个试验期内地上部分干物质质量明显比处理 e 下降,下降最多时则分别低 40.1% 和 13.7%。图 1(b)表明,小麦在 O₃ 浓度 ≤ 2.23 nmol/L 时各处理地上部分干物质质量曲线与处理 E 相似;处理 B 和处理 A 呈抛物线形下降,浓度越大则下降越多。处理 A 和处理 B 在收获时与处理 E 相差最多,分别下降 68.4% 和 43.5%。由此可知,O₃ 对小麦地上部分干物质质量的影响比水稻大。

2.4 O₃ 浓度对作物叶片含水率的影响

在低 O₃ 的条件下水稻与小麦叶片含水率变化呈相同趋势,但水稻比小麦均低 14% (见图 2)。当 O₃ 浓度达 8.93 nmol/L 和 4.46 nmol/L 时,随通气时间的延长作物叶片含水率下降,处理 A 下降较多,下降最大值比处理 E 低 40%;而水稻在此浓度下基本呈平行于处理 e 且与之变化趋势相似;含水率虽比处理 e 低,但最多时仅相差 5%,这表明水稻叶片含水率对 O₃ 浓度大小和通气时间延长的反应不如小麦敏感。

图 1 不同 O₃ 浓度下水稻与小麦地上部分生物量差异

Fig. 1 The variations of ground-biomass of rice and winter wheat in different O₃ concentrations

图 2 不同 O₃ 浓度处理下水稻与小麦叶片含水率曲线

Fig. 2 Water Content ratio of leaf of rice and wheat in different O₃ concentrations

2.5 高浓度 O₃ 对作物叶片的伤害

大气中 O₃ 浓度升高对作物叶片将产生伤害 (见表 3), 由表 3 可知,在相同高浓度时小麦比水稻早出现可见症状,叶片首先退绿并伴随出现褐色斑点、斑块。8.93 nmol/L O₃ 浓度时小麦比水稻早 4~5d 受害,4.46 nmol/L O₃ 浓度时早 2d; 8.93 nmol/L O₃ 浓度时小麦比水稻早约 10d 达中等伤害,小麦受重害时间比水稻早 15~20d,随着伤害加重,小麦重害叶片出现严重失水干枯;而水稻则先退绿,继而出现大面积锈斑,但主叶脉和小叶脉不易受伤害,既使到生长后期其叶脉仍保持正常颜色,并无干枯现象。受害植株脱离 O₃ 环境后,小麦黄化叶片可以恢复,而水稻锈斑叶片略有恢复。

表 3 高浓度 O₃ 下冬小麦与水稻叶片受害情况

Tab. 3 The change of rice and winter wheat leaf injured by O₃ under different O₃ concentrations

作物 (Crop)	O ₃ 浓度 / (nmol·L ⁻¹)	轻害 (10% ≤ 面积 ≤ 30%) Light injury	中害 (30% ≤ 面积 ≤ 50%) Middle injury	重害 (> 50%) Serious injury
冬小麦	8.93	通气后 5~6d, 春生分蘖和底叶退绿, 春生蘖叶尖干枯	通气 10d, 3 龄叶退绿, 且出现棕褐斑点	通气 15d, 4 龄叶出现褐斑, 部分叶片严重失水
	4.46	通气 15d, 1~2 龄叶片退绿	通气 20d, 3 龄叶退绿, 出现少量褐斑	通气 28d, 4 龄以下叶黄化, 失水, 干枯
水稻	8.93	通气 10d, 退绿, 并出现大面积锈斑	通气 20d, 5 龄叶有锈斑	通气 35d, 整株受害, 除旗叶退绿外, 其余各叶均为锈斑
	4.46	通气 17d, 1~2 龄退绿	通气 30d, 4~5 龄叶出现锈斑, 5 龄叶受害略轻	通气 45d, 全株茎木受害 (旗叶及下一叶为退绿)

2.6 O₃ 浓度对作物产量的影响

大气中 O₃ 浓度增加,水稻和小麦产量及其构成各要素指标均有不同程度的下降(见表4)。由表4可知,在 8.93nmol/L O₃ 浓度下水稻单株产量各要素均明显降低,穗粒重下降最大,比处理 e 低 32.5%,其次为产量;小麦单株产量下降最大,比处理 E 下降 81%,为水稻的 2 倍,其次是千粒重,为处理 E 的 59.9%。在 4.46nmol/L O₃ 浓度时小麦产量下降很大,比处理 E 低 60.5%,是水稻的几十倍,此浓度对水稻影响不大。小麦在 2.23nmol/L O₃ 浓度时千粒重最高,比处理 E 高 10.5%。并非浓度越低小麦产量越高,当 O₃ 浓度 < 0.45nmol/L 时水稻和小麦单株产量反而下降,水稻比小麦对低浓度 O₃ 反应更敏感些。从灌浆情况看,高浓度 O₃ 对小麦和 水稻均有不利影响,8.93nmol/L 和 4.46nmol/L O₃ 浓度下水稻非正常灌浆率为 11.7% 和 5.7%,小麦为 100% 和 96.0%,而 2.23nmol/L O₃ 浓度下小麦灌浆最佳,水稻比过滤处理和 4.46nmol/L O₃ 浓度时表现差。根据以上试验分析,当 O₃ 浓度为 2.23nmol/L 时即对水稻和小麦单株产量造成较大影响;当 O₃ 浓度增加到 8.93nmol/L 时水稻减产近 1/3,小麦减产 4/5 以上。由此可以推算,在 8.93nmol/L O₃ 浓度下小麦和水稻可减产 4875kg/hm² 和 1800kg/hm²。在 4.46nmol/L O₃ 浓度下则分别减产 3600kg/hm² 和 150 kg/hm²,因此从 O₃ 对我国主要粮食作物影响角度出发,建议对水稻和小麦粮食作物播种面积调整为 O₃ 浓度在 2.23nmol/L 时水稻和小麦大致可等量播种;O₃ 浓度在 4.46nmol/L 以上时可大力增加水稻面积,减少小麦的播种面积。

表 4 不同 O₃ 浓度处理下水稻与小麦产量及其有关因素

Tab 4 The yields and it's factors of rice and wheat in different O₃ concentrations

作物项目 Crop Items	O ₃ 浓度/nmol·L ⁻¹ Concentration					作物项目 Crop Items	O ₃ 浓度/nmol·L ⁻¹ Concentration				
	8.93	4.46	2.23	0.45	1.12~1.78		8.93	4.46	2.23	0.45	1.12~1.78
水稻单株产量/g	3.794	5.771	4.644	5.018	5.472	冬小麦单株产量/g	1.198	2.526	5.467	6.108	6.397
千粒重/g	19.035	25.108	24.305	25.505	25.414	千粒重/g	19.797	26.358	55.046	49.972	49.826
穗粒数/粒	73.20	83.70	91.60	90.00	92.60	穗粒数/粒	18.80	24.10	24.20	28.90	26.00
穗粒重/g	1.507	2.084	2.104	2.081	2.23	穗粒重/g	0.399	0.669	1.425	1.388	1.383
1次枝梗数	9.20	10.00	9.90	9.60	10.70	小穗数/个	12.00	14.20	13.30	15.70	13.60
空秕谷率/%	11.70	5.70	4.60	5.10	4.30	结实粒数/粒	0.00	4.00	99.00	89.00	94.30

参 考 文 献

- 1 王春乙等 臭氧浓度变化对我国主要作物产量的可能影响. 应用气象学报, 1995, 5(增刊): 69~74
- 2 王春乙等 二氧化碳、臭氧、紫外辐射与农作物生产. 北京: 气象出版社, 1997, 101~120
- 3 丁一汇等 痕量气体对我国农业和生态系统影响研究. 北京: 中国科学技术出版社, 1995
- 4 齐玉春, 董云社, 章 申 农业微环境对土壤温室气体排放的影响. 生态农业研究, 2000, 8(1): 45~48
- 5 沈 宏, 曹志洪 温室气体及其生态效应. 生态农业研究, 1998, 6(3): 21~24
- 6 Olszyk D. M. Effects of sulfur dioxide and ambient ozone on winter wheat and lettuce. J Environ, Qual. 1986, 15: 363~369